

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

突然の下痢に

第2類医薬品

ペロット® 下痢止め (止瀉薬)

塩酸ロペラミド配合

【特徴】

- ペロット下痢止めは、場所を選ばずに服用できる厚さわずか0.09mmのフィルム剤です。
- 口の中で溶け、水なしで服用できるため、突然の下痢にいつでも対応が可能です。
- 有効成分「塩酸ロペラミド」が、腸の過剰なぜん動運動を抑制し、さらに腸内の水分貯留も抑えるW作用を発揮します。
- 薄いプリスターシートです。

W作用ですぐれた効き目

腸の過剰なぜん動運動を抑える


▼

突然のつらい下痢を止める!

▲

腸内の過剰な水分貯留を抑える

いつでもどこでもペロット!



厚さ
0.09mm
※原寸大

携帯に便利な
薄いプリスターシート

水なし1枚、
どこでも飲める!

こんなとき、突然の下痢に



⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)15才未満の小児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
- 服用時は飲酒しないでください

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3)急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがあります。)
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

- (5)授乳中の人。
- (6)高齢者。
- (7)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (8)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (9)便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。
(本剤の服用により便秘が発現することがあります。)
- (10)口の中がかわいている人。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	便秘、腹部膨満感、腹部不快感、悪心、腹痛、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

(必ず裏面もお読みください)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
イレウス様症状 (腸閉塞様症状)	激しい腹痛、ガス排出(おなら)の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

(2) 2～3日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘

〔効能・効果〕

食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢

〔用法・用量〕

次の量を口中で溶かして服用してください。下痢が止まれば服用しないでください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1枚	1日2回
15才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 口中で溶かす場合には、舌の上のせて服用してください。
- 口中がかわいている状態の時などは水又はお湯と共に服用し、水又はお湯がない場合は服用しないでください。
- 定められた用法・用量を厳守してください。

〈フィルム剤の服用方法〉

ペロット下痢止めは、直径15mmの円形のフィルム剤です。下図のようにフィルム剤を手にとって舌の先に張り付くようにのせ、口を閉じて口中で溶かして服用してください。

① 角部から剥がして取りだす。



② 手に取り、舌にのせる。



③ 口を閉じてそのまま口中で溶かしてください。



〔成 分〕 1日量(2枚)中

成 分	分 量	は た ら き
塩酸ロペラミド	1mg	腸に直接作用して、高まったぜん動運動を抑えます。腸の水分・電解質の分泌を抑え、さらに腸への水分吸収を促進し、下痢を改善します。

添加物として、ポビドン、濃グリセリン、水酸化ナトリウム、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、カルボキシビニルポリマー、塩化カルシウム及びアセスルファムカリウム及びその他2成分を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室
TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)
受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931

製造販売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11



A10
ペロット下痢止め