

## くすりのしおり

621783701  
2010年2月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

### 商品名：ピジクリア配合錠

主成分：リン酸二水素ナトリウム一水和物

(Monobasic sodium phosphate monohydrate)

無水リン酸水素二ナトリウム (Dibasic sodium phosphate anhydrous)

剤形：白色～微黄白色の錠剤、長径約 17.6mm、短径約 8.8mm、厚さ約 6.2mm

シート記載：ピジクリア配合錠 ZP55



### この薬の作用と効果について

腸管内に水分を貯留させ、しゃ下作用を示し、腸管洗浄効果をあらわします。

通常、大腸の内視鏡検査前における腸管内容物の排除に用いられます。

### 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。うっ血性心不全、不安定狭心症、QT 延長症候群、心室性不整脈、電解質異常、胃腸管閉塞症、腸管穿孔、中毒性巨大結腸症、急性腎不全、急性リン酸腎症である。心臓、腎臓に障害がある。腹水を伴う病気がある。腸疾患がある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

### 用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** << >> : 医療担当者記入
- ・ 通常、成人は大腸内視鏡検査の 4～6 時間前から 1 回 5 錠ずつ、約 200mL の水（お茶でもよい）とともに 15 分毎に計 10 回、合計 50 錠を 2 時間 30 分で服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 高齢者は、1 回分の 5 錠を数回に分けて 15 分間をかけて約 200mL の水で服用してください。服用中に、めまい、ふらつきなどの異常を感じた場合は担当の医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 本剤は排泄液の状態での服用継続の可否を判断するのではなく、用法・用量に従い、規定用量を服用してください。
- ・ 通常、本剤服用後の排便は、服用開始後、約 1 時間 30 分頃から始まり、約 2 時間 30 分間持続します。服用開始後 4 時間(240 分)以降には、大腸内視鏡検査が実施可能となります。なお、服用開始後約 3 時間 30 分には排泄液がほぼ透明となります。50 錠を飲んででも排便がない場合には、直ちに医師に連絡してください。
- ・ 脱水を予防するために検査前日からこの薬を飲む前、あるいはこの薬を飲み終わった後にも適度な水分（お茶でもよい）をとってください。
- ・ 飲み忘れた場合は担当の医師または薬剤師に相談してください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

### 生活上の注意

#### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、嘔吐、腹部膨満感、倦怠感、めまい、さむけ、気分不快、口渇、発疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 食欲不振、嘔吐、痙攣、意識の低下 [低ナトリウム血症]
- ・ 体のむくみ、尿量減少、全身倦怠感 [急性腎不全、急性リン酸腎症（腎石灰沈着症）]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

#### 保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

※次ページも必ずお読みください。

**医療担当者記入欄** 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。