

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。



炭酸ガスの泡が効く ウィズワン®坐剤

第3類医薬品

便秘薬

〔特 徴〕

ウィズワン坐剤は、微細な球の状態が発生した炭酸ガスが、直腸に働きかけておだやかなお通じをうながします。
坐剤を肛門から挿入した後、およそ10～30分で効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も服用（使用）しないでください
他の便秘薬（下剤、浣腸薬）
3. 連用しないでください
〔常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになります。〕

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	下痢、残便感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック	使用後すぐに胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

3. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

次の症状があらわれることがあります。
肛門部の刺激感、腹部不快感、腹痛

〔効能・効果〕

便秘

〔用法・用量〕

12才以上、1回1個を直腸内に挿入し、それで効果のみられない場合には、さらにもう1個を挿入してください。

12才未満の小児、乳幼児は使用しないでください。

〔用法・用量に関連する注意〕

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんしてください。


(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)

(3) 12才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後使用してください。また、硬すぎる場合には、しばらく室温(30℃以下)に放置し、軟らかくなった後に使用してください。

(5) 本剤は肛門にのみ使用してください。

＜使用方法＞



1) 坐剤の取り出し方および挿入のしかた

① 1個分を切り離します。

② 図のように坐剤容器をはがし、坐剤を取り出してください。

③ 坐剤の後部(細くなっている方)を清潔な指先、ティッシュペーパーやガーゼなどでつまみ、ふくらんだ方から肛門内に出来るだけ深く挿入してください。挿入が困難な場合には、坐剤の先(ふくらんだ方)に少量の水をつけると挿入しやすくなります。

④ 中腰になり、坐剤を押し込んだ後立ち上がると、簡単に挿入できます。

2) 挿入後の注意

挿入後、激しい運動をしますと坐剤が外に出ることがありますので、排便作用があるまで、激しい運動を避けてください。

〔成分〕 1個(2.6g)中

成分	分量	はたらき
炭酸水素ナトリウム	0.5g	微細球状態の炭酸ガスを発生し、腸の運動を促進します。
無水リン酸二水素ナトリウム	0.68g	炭酸ガスの発生を助けるはたらきをします。

添加物：軽質無水ケイ酸、大豆レシチン、ハードファット

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない1～30℃の涼しい所に保管してください。ただし、アルミ袋を開封後の未使用分は、直射日光の当たらない湿気の少ない冷所(1～15℃)に保管してください。

(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(3) 保管する場合は、図のように坐剤の先(ふくらんだ方)を下に向けてアルミ袋に戻し、外箱に入れ、マークに従って立てて保管してください。

(4) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11

受付時間 9:00～17:50(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ウィズワンはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



発売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11



製造販売元

京都薬品工業株式会社

京都市中京区西ノ京月輪町38番地