


シップサルA³の使い方



〔使用上の注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

発売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎ 03-3661-2080

受付 9:00～17:50 (土・日・祝日を除く)

製造
販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173

販売名：シップサルA³ (鎮痛消炎薬)

第3類医薬品

〔特徴〕

- シップサルA³は、皮膚の深部まで浸透して、熱、はれ、痛みをやわらげます。
- 伸縮性、粘着性に優れ、粘着シートなしで激しい動きに対しても患部にピッタリフィットします。
- 植物性成分のグリチルレチン酸は、抗炎症作用の他に、かぶれ防止作用があり、また膏体が弱酸性なので、皮膚の弱い方にもお使いいただけます。
- 膏体はべとつかず、通気性が良くソフトな不織布を用いた上、布面に切れ目が入っているので、むれずに使用感はさわやか、はがすとき痛みを感じません。

〔効能・効果〕

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

〔用法・用量〕

1日1～2回、膏面のライナーを静かにはがし、そのままか、あるいは適当な大きさに切り、患部にはってください。

なお、必要に応じて包帯、粘着テープなどで固定してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるがあるので、使用を控えてください。

〔成分〕 1000cm²(膏体100.000g) 中

dL-カンフル…………… 1.000g グリチルレチン酸…………… 0.050g
 l-メントール…………… 0.500g ビタミンE酢酸エステル…………… 0.100g
 ハッカ油…………… 0.500g

添加物：D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースNa、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、SBR合成ラテックス、ゴムラテックス、pH調節剤、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 フリーダイヤル ☎ 0120-149-931



袋(ビロー)：PE、金属

すてるときには、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。