

*2024年12月改訂

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。



傷ついたお肌の殺菌・消毒に

第3類医薬品

アポスティーローション

APOSTY[®] LOTION

医薬品のローション剤

通常、皮膚の表面には、多種類の細菌がバランスよく存在して、皮膚細菌叢をつくっています。

しかし、あせも、虫刺され、湿疹などをひっかいたり、転んでできた傷に細菌が感染すると、とびひなどの肌トラブルが起こります。

アポスティーローションは、かき傷やすり傷ができたお肌、とびひやおできなど細菌に感染したお肌にお使いいただく、医薬品のローション剤です。

本品の適量を1日数回、顔や手足などの患部にお使いください。

〔特 徴〕

- マイクロエマルジョン製剤なので、べとつかず使用感に優れています。
- 皮膚と同じ弱酸性で、無着色、無香料の外用剤です。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 患部が広範囲の人。
(4) 深い傷やひどいやけどの人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)

〔効能・効果〕

かき傷，創傷面の殺菌・消毒，とびひ・おでき等の感染皮膚面の消毒，きり傷，すり傷，さし傷，靴ずれ



かき傷



感染皮膚面の消毒



創傷面の殺菌・消毒

〔用法・用量〕

1 日数回，適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には，保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一，目に入った場合には，すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお，症状が重い場合には，眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量を守ってください。

〔成分〕 100mL中

成 分	分量	はたらき
ベンゼトニウム塩化物	0.01g	殺菌消毒作用があります。
グリチルリチン酸二カリウム	0.12g	皮膚の炎症を抑えます。
アラントイン	0.12g	傷ついた組織の修復を早めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.1g	患部の血行を良くし，新陳代謝を高めます。

添加物：エタノール，グリセリン，1,3-ブチレングリコール，ソルビタンセスキオレイン酸エステル，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，クエン酸，クエン酸Na，パラベン

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <https://www.zeria.co.jp/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

アポスティはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



*



製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11