

販売名：アシノンZ胃腸内服液H₂ブロッカー胃腸薬 一般用

30mL×3

・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談すること。

・2週間を超えて続けて服用しないこと。重篤な消化器疾患を見過ごすおそれがありますので、医師の診療を受けること。

△ 使用上の注意**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと(1)ニザチジン等のH₂ブロッカー薬によりアレルギー症状(例えば、発疹、発赤、かゆみ、のど、まぶた・口唇等のはれ)を起こしたことがある人。

(2)医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。

血液の病気、腎臓・肝臓の病気、胃・十二指腸の病気、せんそく・リウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生素、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤(白血球減少、血小板減少等を起こすことがある。)(腎臓・肝臓の病気を持っている場合には、薬の排泄が遅れて作用が強くあらわれることがある。)(胃・十二指腸の病気の治療を受けている人は、ニザチジンや類似の薬が処方されている可能性が高いので、重複服用に気をつける必要がある。)

(3)医師から赤血球数が少ない(貧血)、血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人。(本剤を服用するとさらに血球数等が減少する場合がある。)

(4)小児(15才未満)及び高齢者(80才以上)。

(5)妊娠婦又は妊娠していると思われる婦人並びに授乳婦。

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の胃腸薬**相談すること****1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること**

(1)医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3)高齢者(65才以上)。(一般に高齢者は、生理機能が低下していることがある。)

(4)次の症状のある人。

のどの痛み、咳及び高熱(これらの症状のある人は、重篤な感染症の疑いがあり、血球数減少等の血液異常が認められることがある。服用前にこのような症状があると、本剤の服用によって症状が増悪し、また本剤の副作用に気づくのが遅れることがある。)

原因不明の体重減少、持続性の腹痛(他の病気が原因であることがある。)

ご使用に際して、この文書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【用法・用量】 胸やけ、むかつき、胃痛、もたれの症状があらわれた時、下記の1回の量を服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15才以上 80才未満)	1瓶(30mL)	2回まで
小児(15才未満)		
高齢者(80才以上)		服用しないこと。

・服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1瓶(30mL)服用する。

・症状が治まつた場合は、服用を止めること。

・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談すること。

・2週間を超えて続けて服用しないこと。

<用法・用量に関する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守すること。

(2)本剤を服用の際は、アルコール飲料の摂取は控えること。

【成 分】 1回量(1瓶30mL)中 ニザチジン75mg

添加物:エリスリトール、還元麦芽糖水アメ、スクロース、アセスルファムK、トレハロース、ブルーバラベン、クエン酸Na、香料、エタノール、バニリン、pH調節剤2成分

(保管及び取り扱い上の注意)

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2)小児の手のとどかない所に保管すること。

(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎ 03-3661-2080
受付 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

アシノンはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。



4 987103 047018

第1類医薬品

品名コード 3932



箱

金属:キャップ
ガラス:瓶

するときには、お住まいの市町村の定める区分に従ってください。