

服用に際し、表示事項を必ず読むこと。

⚠ 使用上の注意

🗣 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、腹痛、胃痛、胃部不快感、腹部膨満感、食欲不振、胸やけ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
下痢、便秘。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

〔効能効果〕

次の場合のカルシウムの補給：
妊娠・授乳期、発育期、老年期。

〔用法用量〕

成人（15才以上）1回30mL、
1日1～2回服用する。
15才未満は服用しないこと。
（服用には添付の計量コップを使用ください。
数字の単位はmLです。）

製造販売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17

お客様相談窓口 TEL 03-3527-3690

受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時

（土・日・祝日を除く）

パイラン Call

品質保持の点から、開栓後3週間以内に
服用すること。

開栓後要冷蔵

〔成分分量〕

60mL（成人1日量）中
グルコン酸カルシウム水和物…………… 2400mg
乳酸カルシウム水和物…………… 3000mg
クエン酸鉄アンモニウム…………… 30mg
L-リシン塩酸塩…………… 60mg
（カルシウムイオンとして600mg、鉄イオンとして
5mgを含有。）

添加物：D-ソルビトール、粉末還元麦芽糖水アメ、
DL-リンゴ酸、グリチルリチン酸二カリウム、安息
香酸、プロピレングリコール、pH調節剤、香料

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第2類医薬品

500mL

開 栓 年 月 日

開栓時に記入してください

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 開栓後は冷蔵庫に立てて保管すること。
5. 服用のつどフタをよくしめること。
6. 雑菌などの汚染のおそれがあるので、ビンの口に直接口をつけて服用したり、計量コップに入れた薬液をビンにもどさないこと。
7. 開栓後、味、臭いに変化があり異常を感じた場合は直ちに服用を中止すること。
8. ビンの口、計量コップは常に清潔に保つこと。
9. ビンの口、キャップに白い結晶が現れたり、白い沈殿が生じることがありますが、これは内容成分のカルシウムの結晶です。
10. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

製造番号 ◆ 使用期限（年・月）



キャップ：PP 中栓：PP
フィルム：PET 計量コップ：PS

ガラス：ビン

AS2209