

服用に際し、表示事項を必ず読むこと。

⚠ 使用上の注意

👨‍⚕️ 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
医師の治療を受けている人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
下痢、便秘。
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効 能 効 果

次の場合の骨歯の発育促進：
虚弱体質、腺病質^注。妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止。
^注「腺病質」とは貧血などになりやすい虚弱・無力体質を指します。

製 造 販 売 元
健創製薬株式会社
東京都中央区日本橋小舟町 9-17
お客様相談窓口 TEL 03-3527-3690
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
(土・日・祝日を除く)

Calcium

シーエーアップ® **グレープフルーツ味**

指定医薬部外品 **500mL**

用 法 用 量

次の1回量を1日1～2回服用する。
(服用には添付の計量コップを使用ください。数字の単位はmLです。)

年 令	1 回 量
成人 (15才以上)	20mL
11才以上 15才未満	15mL
7才以上 11才未満	10mL
3才以上 7才未満	5mL
1才以上 3才未満	2.5mL
1才未満	服用しないこと

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を守ること。(他のカルシウムを含有する製品を同時に使用する場合には、過剰摂取などに注意すること)
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分 分 量

40mL (成人1日量) 中
グルコン酸カルシウム水和物……………3000mg
(カルシウムイオンとして268.1mg)
添加物：クエン酸水和物、D-ソルビトール、塩化Na、安息香酸、リボフラビンリン酸エステルNa、プロピレングリコール、pH調整剤、香料。

開栓時に記入してください。

開 栓 年 月 日

品質保持の点から、開栓後3週間以内に服用すること

開栓後要冷蔵

保管および取扱い上の注意

- 1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- 2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 3. 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 4. 服用のつどフタをよくしめること。
- 5. 雑菌などの汚染のおそれがあるので、ビンの口に直接口をつけて服用したり、計量コップに入れた薬液をビンにもどさないこと。
- 6. 開栓後、味、臭いに変化があり異常を感じた場合は直ちに服用を中止すること。
- 7. ビンの口、計量コップは常に清潔に保つこと。
- 8. ビンの口、キャップに白い結晶が現れたり、白い沈殿が生じることがありますが、これは内容成分のカルシウムの結晶です。
- 9. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

製造番号 ◆ 使用期限 (年・月)

--

 **キャップ 中栓**
 **フィルム 計量コップ** **ガラス:ビン**
AS2209