

使用前请仔细阅读本说明书。
同时请进行妥善保管，以方便在必要时随时取阅。

第2类医药品



湿疹、皮肤炎治疗药物

プレバリン[®]α クイッククリーム

Prevaline α Quick 乳膏

对患处起效，体内活性低

〔特点〕

Prevaline α Quick 乳膏是一款 Antedrug 型的类固醇制剂，对湿疹、皮肤炎具有良好的效果。

湿疹、皮肤炎、痒疮等都是日常生活中常见的皮肤病，但发痒或斑疹严重时，可能会不自觉地抓伤，使症状进一步恶化。

Prevaline α Quick 乳膏是一款不粘腻且使用感良好的乳膏型皮肤疾病治疗药物，其在抑制此类炎症的类固醇制剂中添加了可抑制发痒的成分。

什么是 Antedrug 类固醇？

本品所含的类固醇成分泼尼松龙醋酸戊酸酯是一种 Antedrug 类固醇，能在皮肤表面充分发挥作用，而吸收到体内后则被迅速分解，变为活性低的成分。



使用注意事项

禁止事项



（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

1. 请不要用于下述部位
 - （1）水痘、脚癣/顽癣等或化脓患处。
 - （2）眼睛周围、粘膜（如嘴唇等）。
2. 请不要在脸部大范围使用
3. 请不要长期连续使用

咨询事项



1. 以下人群在使用前请咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 - （1）正在接受医师治疗的人群。
 - （2）孕妇或有其可能性的人群。
 - （3）因药物等出现过过敏症状的人群。
 - （4）患处范围较大的人群。
 - （5）湿润或糜烂较为严重的人群。
2. 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时请立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

相关部位	症状
皮肤	起疹/发红、发痒、红肿
皮肤（患处）	脚癣/顽癣等白癣、粉刺、化脓症状、持续刺激感

3. 若使用 5~6 天后症状仍无改善则请中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

（请务必阅读背面）

〔效能或效果〕

湿疹、皮肤炎、痒疮、斑疹、发痒、虫咬、荨麻疹




〔用法及用量〕

1 天几次，取适量涂抹于患处。

〈用法及用量相关注意〉

- (1) 儿童使用时请在监护人指导监督下使用。
- (2) 注意不要入眼。不慎入眼时请立即用冷水或温水进行清洗。症状严重时，请前往眼科就诊。
- (3) 仅限外用。
- (4) 涂抹本品后，请勿用保鲜膜等透气性差的物品覆盖患处。

〔药管的开孔方法〕



将管盖倒过来，把突出部分用力刺进药管前端以开孔。

〔成分〕 100g 中

泼尼松龙醋酸戊酸酯	0.15g
马来酸氯苯那敏	1g
维生素 E 醋酸酯	0.5g
利多卡因	2g
异丙基甲基苯酚	0.1g
尿囊素	0.25g
γ-谷维素	1g

辅料：依地酸二钠、枸橼酸、纯化水、白凡士林、中链甘油三酸酯、山嵛醇、聚氧乙烯花生醚/硬脂醇混合物、角鲨烷、浓甘油、1,3-丁二醇、对羟基苯甲酸丁酯

〔保管及使用注意事项〕

- (1) 请密闭保管在避免阳光直射的阴凉场所。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。
- (4) 请不要使用过期产品。

有关 OTC 医疗药品的多语种产品资料的免责事项

・ 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

・ 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

・ 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

・ 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任。