

商品名: **ヘパリーゼ®ドリンクII**
Hepalyse Drink II



第3类医药品

〔使用注意事项〕**咨询事项**

1. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时请立即中止服用，并携带本产品咨询医师、药剂师或登录贩卖者

相关部位	症 状
皮 肤	起 疹
消化系统	烧心、恶心、腹泻

2. 若服用一段时间后症状仍无改善则请中止服用，并携带本产品咨询医师、药剂师或登录贩卖者

〔效能或效果〕滋补，肠胃障碍、营养障碍、病中病后、身体疲劳、发热性消耗性疾病、妊娠哺乳期等情况时的营养补充，虚弱体质

〔用法及用量〕成人（15岁以上）1次1瓶（50mL），1天服用1次。未满15岁不要服用。

●请遵守用法及用量。

〔成 分〕1瓶（50mL）中 肝脏水解物 200mg、硫酸软骨素钠 120mg、二氯乙酸二异丙胺 20mg、五味子提取物 54mg（相当于五味子 300mg）、枸杞流浸膏 0.2mL（相当于枸杞 200mg）、黄芪流浸膏 0.1mL（相当于黄芪 100mg）、牛磺酸 1000mg、维生素 B₂磷酸酯 5mg、维生素 B₆ 10mg、烟酰胺 20mg

辅料：果葡糖浆（HFCS）、焦糖、苯甲酸钠、对羟基苯甲酸丁酯、柠檬酸钠水合物、香料、乙醇、丙二醇、香草醛、乙基香草醛、pH 值调节剂 2 种成分（酒精≤0.1mL）

●本品中添加的维生素 B₂磷酸酯可能会导致尿液变黄。

〔保管及使用注意事项〕（1）请保管在避免阳光直射的阴凉场所。（2）请保管在儿童无法触及的地方。

（3）本品在极少数情况下可能会混浊，但其药效不变。（4）请不要服用过期产品。

有关 OTC 医疗药品的多语种产品资料的免责声明

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任。