

使用前请仔细阅读本说明书。
同时请进行妥善保管，以方便在必要时随时取阅。

第2类药品



用于敏感部位的肌肤问题（发痒、斑疹）

プレバリンマイケア

Prevaline MyCare

肌肤问题治疗药物

因为是敏感部位，更希望能及早治愈！

敏感部位的肌肤很娇嫩，容易因为一点点的刺激而发痒、发红。原因包括流汗、闷热、内衣与衣物造成摩擦等。任何人都希望能够及早治愈。

如果因为太痒，无意识中一直抓痒，就会降低肌肤屏障功能及固有的抵抗力，导致肌肤状况恶化。

Prevaline MyCare 是一款专为快速解决此类敏感部位的肌肤问题而打造的乳膏剂，可使肌肤尽快恢复到原本状态。



让肌肤及早复原的乳膏剂

1) 弱酸性的乳膏剂



贴合肌肤 pH 值的弱酸性乳膏，可温和治愈患处。

2) 帮助肌肤复原的 5 种有效成分

利多卡因和盐酸苯海拉明可抑制发痒，甘草酸二钾可抑制炎症。尿囊素可加快表皮修复，生育酚醋酸酯（维生素 E 醋酸酯）可促进血液循环，加快患处的恢复。


3) 抑制敏感部位的发痒和炎症

未添加类固醇，因此也可用于敏感区域或面部发红。



示意图

⚠ 使用注意事项



咨询事项

- 以下人群在使用前请咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 - 正在接受医师治疗的人群。
 - 因药物等出现过过敏症状的人群。
 - 湿润或糜烂较为严重的人群。

2. 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时请立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药师或登录贩卖者

| 相关部位 | 症状 |
|------|-------------|
| 皮肤 | 起疹/发红、发痒、红肿 |

3. 若使用 5~6 天后症状仍无改善则请中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

(效能或效果)

发痒、斑疹、糜烂、痈疮、湿疹、皮肤炎、冻疮、虫咬、荨麻疹

(用法及用量)


1天几次，取适量涂抹于患处。

〈用法及用量相关注意〉

- (1) 儿童使用时请在监护人指导监督下使用。
 - (2) 注意不要入眼。不慎入眼时请立即用冷水或温水进行清洗。症状严重时, 请前往眼科就诊。
 - (3) 仅限外用。

(药管的开孔方法)

将管盖倒过来，把突出部分用力刺进药管前端以开孔。



(成分) 100g 中

| | |
|--|------|
| 盐酸苯海拉明 | 2g |
| 生育酚醋酸酯 | 0.5g |
| 利多卡因 | 2g |
| 甘草酸二钾 | 0.5g |
| 尿囊素 | 0.2g |
| 辅料: 透明质酸钠、依地酸二钠、枸橼酸、L-乳酸、轻质液体石蜡、白凡士林、黄原胶、十六十八醇、山嵛醇、浓甘油、1,3-丁二醇、对羟基苯甲酸丁酯、其他2种成分 | |

（保管及使用注意事项）

- (1) 请密闭保管在避免阳光直射的阴凉场所。
 - (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
 - (3) 请不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。
 - (4) 请不要使用过期产品。

有关 OTC 医疗药品的多语种产品资料的免责事项

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的法律获得认可的医疗药品。
 - 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
 - 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
 - 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任。