

使用前請詳讀本仿單。
請妥善保存，以便需要時查閱。

第2類醫藥品



治療濕疹、皮膚炎藥物
プレバリン[®] α クイック 軟膏
Prevaline α Quick 軟膏
專治症狀部位，體內穩定性佳

(特色)

Prevaline α Quick 軟膏是 Antedrug (安藥) 型的類固醇藥劑，對於濕疹、皮膚炎具有良好效果。濕疹、皮膚炎、汗疹等都是日常生活常見的皮膚病，如果搔癢或斑疹症狀嚴重，容易使人在無意識中抓傷，而有可能導致症狀惡化。

Prevaline α Quick 軟膏在抑制此類炎症的類固醇藥劑中添加可抑制搔癢的成分，是保護症狀部位的軟膏型皮膚病治療藥。

Antedrug (安藥) 類固醇是什麼：

本品所含的類固醇成份培尼皮質醇戊酸酯乙酸酯是一種 Antedrug 類固醇，能在皮膚表面的症狀部位發揮高度抗發炎藥效，吸收到體內之後就會被快速分解活性成份，藥效隨之減弱。

⚠ 使用注意事項

禁止事項



(未加以遵守將使目前症狀惡化，或容易引起副作用)

1. 請勿使用於下列部位

- (1) 水痘、足癬及癬菌等或化膿症狀部位。
- (2) 眼睛周圍、黏膜（例如口唇等）。

2. 請勿大範圍使用於臉部

3. 請勿長期連續使用

諮詢事項



1. 有下列情況者，請向醫師、藥劑師或合格銷售藥商進行諮詢

- (1) 正在接受醫師治療者。
- (2) 孕婦或有可能懷孕者。
- (3) 曾因藥物等原因導致過敏症狀者。
- (4) 痘狀部位範圍廣大者。
- (5) 痘狀部位濕潤或潰爛狀況嚴重者。

2. 使用後若出現下列症狀，有可能是副作用，請立即停止使用，並持此仿單向醫師、藥劑師或合格銷售藥商進行諮詢

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢、紅腫
皮膚（症狀部位）	足癬及癬菌等白癬、瘡瘍、化膿症狀、持續性刺激感

3. 若使用 5~6 日症狀仍未減緩，請停止使用，並持此仿單向醫師、藥劑師或合格銷售藥商進行諮詢

(背面也請務必詳閱)

(效能、效果)

濕疹、皮膚炎、汗疹、皮疹、搔癢、蚊蟲叮咬、蕁麻疹




(用法、用量)

一天數次，請適量塗擦於症狀部位。

〈用法、用量相關注意事項〉

- (1) 兒童使用時，請在有監護人指導監督的情況下進行使用。
- (2) 請小心避免誤入眼睛。不慎誤入眼睛時，請立即以清水或溫水清洗。症狀嚴重時，請至眼科就診。
- (3) 僅供外用。
- (4) 塗擦本藥後，請勿以保鮮膜等不透氣敷料包覆症狀部位。

(軟管的開口方法)



請將蓋子倒置，並將突起處對準管口用力按壓。

(成分)

每 100g 含有	
培尼皮質醇戊酸酯乙酸酯	0.15g
馬來酸氯苯那敏	1g
維生素 E 乙酸酯	0.5g
利多卡因	2g
異丙基甲苯酚	0.1g
尿囊素	0.25g
γ-穀維素	1g

添加物:硬脂醇、鯨蠟醇、液體石蠟、白凡士林、中鏈甘油三酸酯、微晶蠟、角鯊烷、癸二酸二乙酯、棕櫚酸異丙酯

(保存及使用注意事項)

- (1) 請旋緊蓋子置於陰涼處，避免陽光直射。
- (2) 請存放於兒童無法取得的地方。
- (3) 請勿換裝至其他容器中使用。（可能會被誤用或可能導致變質。）
- (4) 請勿使用過期產品。

有关 OTC 医疗药品的多语种产品资料的免责事项

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任。