

使用前請詳讀本仿單。
請妥善保存，以便需要時查閱。

第2類醫藥品



治療濕疹、皮膚炎藥物

プレバリン®α クイッククリーム

Prevaline α Quick 乳霜

專治症狀部位，體內穩定性佳

〔特色〕

Prevaline α Quick 乳霜是 Antedrug（安藥）型的類固醇藥劑，對於濕疹、皮膚炎具有良好效果。

濕疹、皮膚炎、汗疹等都是日常生活常見的皮膚病，如果搔癢或斑疹症狀嚴重，容易使人在無意識中抓傷，而有可能導致症狀惡化。

Prevaline α Quick 乳霜在抑制此類炎症的類固醇藥劑中添加可抑制搔癢的成分，是不黏膩、使用感佳的乳霜型皮膚病治療藥。

Antedrug（安藥）類固醇是什麼：

本品所含的類固醇成份培尼皮質醇戊酸酯乙酸酯是一種 Antedrug 類固醇，能在皮膚表面的症狀部位發揮高度抗發炎藥效，吸收到體內之後就會被快速分解活性成份，藥效隨之減弱。



使用注意事項

禁止事項



（未加以遵守將使目前症狀惡化，或容易引起副作用）

1. 請勿使用於下列部位
 - （1）水痘、足癬及癬菌等或化膿症狀部位。
 - （2）眼睛周圍、黏膜（例如口唇等）。
2. 請勿大範圍使用於臉部
3. 請勿長期連續使用

諮詢事項



1. 有下列情況者，請向醫師、藥劑師或合格銷售藥商進行諮詢
 - （1）正在接受醫師治療者。
 - （2）孕婦或有可能懷孕者。
 - （3）曾因藥物等原因導致過敏症狀者。
 - （4）症狀部位範圍廣大者。
 - （5）症狀部位濕潤或潰爛狀況嚴重者。
2. 使用後若出現下列症狀，有可能是副作用，請立即停止使用，並持此仿單向醫師、藥劑師或合格銷售藥商進行諮詢

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢、紅腫
皮膚（症狀部位）	足癬及癬菌等白癬、痤瘡、化膿症狀、持續性刺激感

3. 若使用 5～6 日症狀仍未減緩，請停止使用，並持此仿單向醫師、藥劑師或合格銷售藥商進行諮詢

（背面也請務必詳閱）

〔效能、效果〕

濕疹、皮膚炎、汗疹、皮疹、搔癢、蚊蟲叮咬、蕁麻疹




〔用法、用量〕

一天數次，請適量塗擦於症狀部位。

〈用法、用量相關注意事項〉

- (1) 兒童使用時，請在有監護人指導監督的情況下進行使用。
- (2) 請小心避免誤入眼睛。不慎誤入眼睛時，請立即以清水或溫水清洗。症狀嚴重時，請至眼科就診。
- (3) 僅供外用。
- (4) 塗擦本藥後，請勿以保鮮膜等不透氣敷料包覆症狀部位。

〔軟管的開口方法〕



請將蓋子倒置，並將突起處對準管口用力按壓。

〔成分〕 每 100g 含有

培尼皮質醇戊酸酯乙酸酯	0.15g
馬來酸氯苯那敏	1g
維生素 E 乙酸酯	0.5g
利多卡因	2g
異丙基甲苯酚	0.1g
尿囊素	0.25g
γ-穀維素	1g

添加物：乙二胺四乙酸二鈉二水合物、檸檬酸水合物、純化水、白凡士林、中鏈甘油三酸酯、山嵎醇、聚氧乙
烯花生醚/硬脂醇混合物、角鯊烷、濃甘油、1,3-丁二醇、對羥苯甲酸丁酯

〔保存及使用注意事項〕

- (1) 請旋緊蓋子置於陰涼處，避免陽光直射。
- (2) 請存放於兒童無法取得的地方。
- (3) 請勿換裝至其他容器中使用。（可能會被誤用或可能導致變質。）
- (4) 請勿使用過期產品。

有關 OTC 醫療藥品的多語種產品資料的免責事項

・本產品以作為在日本國內進行銷售及使用為目的，基於日本有關保證醫療藥品、醫療器械等的質量、有 效性及安全性的法律獲得認可的醫療藥品。

・多語種產品資料是根據該產品的日文說明書翻譯而成的，僅供參考。其資料並不保證所記載的內容及該 產品本身符合日本以外國家的法律法規。

・多語種產品資料由提供方（或本公司）臨時翻譯而成，未來可能不提前預告即進行修改或更改。

・關於因為多語種產品資料的內容所引起的問題，提供方（或本公司）概不承擔一切責任。