

使用前請詳讀本份單。  
請妥善保存，以便需要時查閱。

第2類醫藥品



專治敏感部位的肌膚問題（搔癢、皮疹）

プレバリン<sup>®</sup>マイケア

Prevaline MyCare

肌膚問題治療藥

因為是敏感部位，所以想快點痊癒！

肌膚柔軟的敏感部位，即使受到輕微刺激也會搔癢發紅，而原因包括汗水悶熱、內衣及衣物造成的摩擦等，每個人都會希望能夠儘快治癒。

如果因為強烈搔癢而在無意中頻繁抓癢，保護功能就會衰退，使皮膚原有的抵抗力下降，導致肌膚狀況惡化。

Prevaline MyCare 乳霜可及時處理這類敏感部位肌膚問題，使肌膚儘快恢復到原本的狀態。



幫助肌膚儘快復原的乳霜

1) 弱酸性乳霜



配合肌膚 pH 值的弱酸性乳霜，可溫和治癒症狀部位。

2) 幫助肌膚復原的 5 種有效成分

利多卡因、鹽酸苯海拉明可減緩發癢症狀，甘草酸二鉀可抑制炎症。尿囊素加速表皮修復，生育酚乙酸酯（維生素 E 醋酸酯）促進血液循環，加速症狀部位復原。

3) 抑制敏感部位的搔癢症狀

未添加類固醇，因此也可使用於敏感部位及臉部泛紅等症狀。



示意圖

⚠ 使用注意事項

諮詢事項

- 有下列情況者，請向醫師、藥劑師或合格銷售藥商進行諮詢
  - 正在接受醫師治療者。
  - 曾因藥物等原因導致過敏症狀者。
  - 症狀部位濕潤或潰爛狀況嚴重者。

2. 使用後若出現下列症狀，有可能是副作用，請立即停止使用，並持此仿單向醫師、藥劑師或合格銷售藥商進行諮詢

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢、紅腫

3. 若使用 5~6 日症狀仍未減緩，請停止使用，並持此仿單向醫師、藥劑師或合格銷售藥商進行諮詢

(效能、效果)

發癢、皮疹、潰爛、汗疹、濕疹、皮膚炎、凍瘡、蚊蟲叮咬、蕁麻疹

(用法、用量)


一天數次，請適量塗擦於症狀部位。

## 〈用法、用量相關注意事項〉

- (1) 兒童使用時，請在有監護人指導監督的情況下進行使用。
  - (2) 請小心避免誤入眼睛。不慎誤入眼睛時，請立即以清水或溫水清洗。症狀嚴重時，請至眼科就診。
  - (3) 僅供外用。

### (軟管的開口方法)

請將蓋子倒置，並將突起處對準管口用力按壓。



(成分) 每 100g 含有

鹽酸苯海拉明	2 g
生育酚乙酸酯	0.5 g
利多卡因	2 g
甘草酸二鉀	0.5 g
尿囊素	0.2 g
添加物:透明質酸鈉、乙二胺四乙酸二鈉二水合物、檸檬酸水合物、L-乳酸、輕質液體石蠟、白凡士林、黃原膠、鯨蠣硬脂醇、山嵛醇、濃甘油、1,3-丁二醇、對羥苯甲酸丁酯及其他2種成分	

#### (保存及使用注意事項)

- (保存及使用注意事項)

  - (1) 請旋緊蓋子置於陰涼處，避免陽光直射。
  - (2) 請存放於兒童無法取得的地方。
  - (3) 請勿換裝至其他容器中使用。（可能會被誤用或可能導致變質。）
  - (4) 請勿使用過期產品。

有關 OTC 醫療藥品的多語種產品資料的免責事項

- ・本產品以作為在日本國內進行銷售及使用為目的，基於日本有關保證醫療藥品、醫療器械等的質量、有效性和安全性的法律獲得認可的醫療藥品。
  - ・多語種產品資料是根據該產品的日文說明書翻譯而成的，僅供參考。其資料並不保證所記載的內容及該產品本身符合日本以外國家的法律法規。
  - ・多語種產品資料由提供方（或本公司）臨時翻譯而成，未來可能不提前預告即進行修改或更改。
  - ・關於因為多語種產品資料的內容所引起的問題，提供方（或本公司）概不承擔一切責任。