

肝臓水解物 コンドロイチン配合

ヘパリーゼ[®] ドリンクII

Hepalyse

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給



50mL 第3類医薬品

 **ゼリア新薬**

販売名：ヘパリーゼドリンクII

第3類医薬品

【使用上の注意】 **相談すること**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胸やけ、吐き気、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 滋養強壮、胃腸障害・栄養障害・病中病後・肉体疲労・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、虚弱体質

【用法・用量】 成人(15才以上)1回1瓶(50mL)を1日1回服用する。なお、15才未満は服用しないこと。

●用法・用量を守ること。

【成 分】 1瓶(50mL)中 肝臓水解物200mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム120mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン20mg、ゴシエキス54mg(ゴシシ300mgに相当)、クコシ流エキス0.2mL(クコシ200mgに相当)、オウギ流エキス0.1mL(オウギ100mgに相当)、タウリン1000mg、ビタミンB₂リン酸エステル5mg、ビタミンB₆10mg、ニコチン酸アミド20mg

添加物：異性化糖、カラメル、安息香酸Na、ブチルパフベン、クエン酸Na水和物、香料、エタノール、プロピレングリコール、パニリン、エチルパニリン、pH調節剤2成分(アルコール0.1mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3661-2080



MADE IN JAPAN

製造番号

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

使用期限

金属:キャップ、ガラス:瓶

[年、月]

ヘパリーゼはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。