



胃腸障害時の栄養補給，滋養強壮に

**ヘパリーゼプラスII**

肝臓水解物・イノシトール配合

滋養強壮保健剤

## 〔特 徴〕

- \*ヘパリーゼプラスIIは，天然の良質なレバーを消化吸収しやすいように分解した「肝臓水解物」を主成分として配合した医薬品です。
- \*お付き合いや残業の機会が多く疲れを感じた時や，胃腸の調子が良くない時などの栄養補給に効果を発揮します。
- \*肝臓水解物やイノシトールが新陳代謝を高めるとともに，ビタミンB<sub>2</sub>・Eが栄養補給に働きます。
- \*赤褐色の糖衣錠です。



## 使用上の注意

### 相談すること



1. 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----|
| 皮膚   | 発疹  |

2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

滋養強壮，胃腸障害・栄養障害・病中病後・肉体疲労・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給，虚弱体質

(このような時の栄養補給，滋養強壮に)



疲れたとき



胃腸の調子が悪い



食欲がない

## 〔用法・用量〕

次の1回量を1日2回服用してください。

| 年 齢       | 1回量         | 1日服用回数 |
|-----------|-------------|--------|
| 成人(15才以上) | 3錠          | 2回     |
| 15才未満     | 服用しないでください。 |        |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)食前・食後，いずれの服用でもかまいません。

(必ず裏面をお読みください)

〔成分〕 1日量(6錠)中

| 成分                             | 分量    | はたらき                                                              |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 肝臓水解物                          | 600mg | 天然の良質なレバーを消化吸収しやすいように分解したものです。<br>肝臓の新陳代謝を活発にする事により、滋養強壮効果を発揮します。 |
| イノシトール                         | 100mg | 肝臓水解物とともに働いて滋養強壮効果を発揮します。                                         |
| ビタミンB <sub>2</sub><br>(リボフラビン) | 12mg  | 全身の新陳代謝に欠かせないビタミンです。                                              |
| ビタミンE<br>酢酸エステル                | 10mg  |                                                                   |

添加物：D-マンニトール、ケイ酸カルシウム、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、アラビアゴム末、結晶セルロース、精製白糖、ヒプロメロース、プルラン、硫酸カルシウム、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、赤色三号、青色一号、カルナウバロウ

〈成分・分量に関連する注意〉

- 本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは成分のビタミンB<sub>2</sub>によるものですので、ご心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)高温となる場所には保管しないでください。(錠剤の亀裂や変色の原因となります。)
- (3)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (5)瓶の中の詰め物を捨てたのちは、落下等の衝撃で錠剤破損(糖衣の欠け)が生じることがありますので、取扱いには注意してください。なお、開封時等に肝臓水解物の特有なにおいを感じることがあります。
- (6)本剤は糖衣錠ですので、水分が錠剤につくと、表面の糖衣が一部とけて、変色又はむらが生じることがありますから、ぬれた手で取扱わないようにしてください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080  
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11  
受付時間 9:00～17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ヘパリーゼはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元  
**ゼリア新薬工業株式会社**  
東京都中央区日本橋小舟町 10-11