

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

ビタミン含有滋養強壮薬

滋養強壮・虚弱体質

第3類医薬品

サンレバンエース

製品の特徴

サンレバンエースは疲れたカラダにはたらく肝臓加水分解物に、カラダのエネルギーの代謝を助ける3つのビタミンB群やタウリン、2種類のアミノ酸を配合したオレンジ色の糖衣錠です。病中病後や疲れなどの栄養補給に服用ください。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能効果

滋養強壮。虚弱体質。肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。

用法用量

次の1回量を1日3回 服用する。

年 令	1 回 量
成人（15才以上）	2錠
15才未満	服用しないこと

成分分量

6錠（成人1日量）中

成 分	分量	は た ら き
肝臓加水分解物	400mg	新鮮な哺乳類の肝臓を加水分解したアミノ酸が主成分で、肝機能などを高め疲れたカラダに栄養を送ります。
タウリン	200mg	栄養の吸収や代謝を促進するはたらきがあります。
L-メチオニン	200mg	肝臓のはたらきを助け、老廃物の排泄をうながすアミノ酸の補給をします。
L-アルギニン塩酸塩	200mg	
チアミン硝化物(ビタミンB ₁)	20mg	糖質や脂質、タンパク質の代謝に関与し、栄養素を効率よくはたらかせるビタミンです。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg	
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg	

添加物としてセルロース、ポピドン、硬化油、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、タルク、アラビアゴム、リン酸水素Ca水和物、炭酸Ca、酸化チタン、ゼラチン、硫酸Ca、セラック、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、カルナウバロウ、サラシミツロウ、黄色5号を含有する。

〈成分分量に関連する注意〉

- (1) 尿を黄変させることがある。
- (2) 臨床検査値に影響を与えることがある。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 水分が付いた錠剤は、瓶に戻さないこと（変色の原因になったり品質が変わる）。
5. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

〔問い合わせ先〕

1. 購入した薬局・薬店
2. 健創製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3527-3690
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
（土・日・祝日を除く）

製造販売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ☎ 0120-149-931