

使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

便秘、下痢。

3. しばらく服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手とどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 生薬成分が変質することがありますが、薬効には変わりありません。
5. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

副作用被害救済制度

00120-149-931

ガラス：ビン 金属：キャップ
4987926328097
AS2104

健創清心液

滋養強壯

第3類医薬品

50mL

成分分量 1本(50mL)中

ゴウウチンキ……………2000μL(原生薬として20mg)
ロクジョウチンキ……………350μL(原生薬として100mg)
ニンジン流エキス……………1500μL(原生薬として1500mg)
センキュウ流エキス……………100μL(原生薬として100mg)
トウキ流エキス……………60μL(原生薬として60mg)
カンショ流エキス……………100μL(原生薬として100mg)
ケイヒ流エキス……………100μL(原生薬として100mg)
オウキ流エキス……………300μL(原生薬として300mg)
リボフラビン(ビタミンB₂)……………10 mg
ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)……………10 mg
酢酸d-α-トコフェロール(ビタミンE)……………10 mg
無水カフェイン……………50 mg
(アルコール……………1mL以下)
添加物：クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、
酒石酸、pH調節剤、香料、ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油、水アズ、白糖、ブドウ糖、カラメル、塩
化Na。

＜成分分量に関連する注意＞
尿を黄変させることがある。

用法用量 次の1回量を1日1回服用する。

年 令	1回量
成人(15才以上)	1本
15才未満	服用しないこと

効能効果

滋養強壯・虚弱体質・肉体的疲労・
病中病後・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・産前産後など
の場合の栄養補給。

製造番号 ◆ 使用期限(年、月)

製造販売元
健創製薬株式会社
東京都中央区日本橋小舟町9-17
電話：03-3527-3630