

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## みずむし・たむし治療薬 1日1回で効く



# バリア外<sup>Hi2</sup>プラス

第2類医薬品

# スプレー

### 〔特徴〕

- テルビナフィン塩酸塩の殺真菌作用と角質浸透性により、1日1回の噴霧で白癬菌を殺菌します。
- 7種の有効成分がみずむし、たむし等による不快なかゆみ、痛みを鎮めます。
- 速乾性に優れ、患部にピンポイントに届くスプレーです。

### ⚠ 使用上の注意

#### してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください  
(1) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。  
(2) 湿疹。  
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 乳幼児。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 患部が顔面又は広範囲の人。  
(6) 患部が化膿している人。  
(7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、 <small>りんせつ らくせつ</small> 鱗屑・落屑 (フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

\*：全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜいたむし

## 【用法・用量】

1日1回、適量を患部に噴霧してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (7) キャップを取り、容器の吹き出しノズルを患部に向け、頭部を押して噴霧してください。出ない場合は数回空吹きしてください。

## 【成分】 1g中

成分	分量	はたらき
テルビナフィン塩酸塩	10mg	白癬菌に選択的に作用し、菌の代謝を阻害し、発育増殖を阻止します。
リドカイン	20mg	患部のかゆみを抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	5mg	患部のかゆみを抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	患部の炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	3mg	患部を殺菌します。
l-メントール	20mg	患部に清涼感を与え、痛み、かゆみを抑えます。
クロタミトン	50mg	患部のかゆみを抑えます。

添加物：エタノール、1,3-ブチレングリコール、ヒドロキシプロピルセルロース、pH調節剤、その他1成分

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) 使用済み容器を火中に投げないでください。
- (7) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。

## 【みずむし治療のアドバイス】

### 清潔



患部は常に清潔に。薬を塗る前に薬用石鹸で洗ったり、清浄綿でぬぐうと効果的。

### 殺菌



みずむしの原因となる白癬菌を殺菌する抗白癬菌剤を用いた薬剤(バリアクトHi2プラスプレーなど)を使います。患部へ噴霧する場合は、広めに塗り、お風呂上がりの時が効果的。

### 冷やす



ただれがひどい場合は、冷やすと同時に乾燥させるのに適切な軟膏を塗り、患部が乾燥してから液剤を使います。

### 乾燥



みずむしは乾燥が苦手。靴下、肌着は通気性のよい素材を選び、清潔に心がけます。

### 根気



みずむしは再発と再感染しやすい病気です。自覚症状がなくなってもしばらくは治療を続けましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080  
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11  
受付時間 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

ホームページ <https://www.zeria.co.jp>

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

バリアクトはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



発売元  
**ゼリア新薬工業株式会社**  
東京都中央区日本橋小舟町10-11

製造販売元  
**東光薬品工業株式会社**  
東京都足立区新田2丁目16番23号