

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

要指導医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	コルペルミン
2	成分・分量	1日量(3カプセル)中 セイヨウハッカ油(ペパーミントオイル)561mg
3	用法・用量	<p>成人(15歳以上):1回1カプセルを1日3回食前又は食間に服用してください 15歳未満は服用しないでください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定められた用法・用量を守って、毎日服用してください ・食事とともに服用することはさけてください(胸やけを起こすことがあります) ・本剤は腸溶性のカプセルですので、かんだり、つぶしたりせずに、そのまま服用してください(胸やけを起こすことがあります) ・2週間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください ・症状の改善がみられても3ヵ月を超えて続けて服用する場合は、医師にご相談ください
4	効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ・過敏性腸症候群の次の諸症状の緩和:腹痛又は腹部不快感を伴い、繰り返し又は交互に現れる下痢及び便秘(以前に医師の診断・治療を受けた人に限る)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 医師から過敏性腸症候群の診断・治療を受けたことがない人 (2) 過敏性腸症候群の再発かどうかよくわからない人(例えば、今回の症状は、以前に過敏性腸症候群の診断・治療を受けた時と違う) (3) 就寝中などの夜間にも、排便のためにトイレに行きたくなくなったり、腹痛がある人 (4) 発熱がある人 (5) 関節痛がある人 (6) 粘血便(下血)がある人 (7) 繰り返すひどい下痢がある人 (8) 急性の激しい下痢がある人 (9) 排便によってよくなる腹痛がある人 (10) 嘔吐がある人 (11) 6ヵ月以内に、体重が3kg以上、予期せず減少した人 (12) 次の病気にかかったことのある人 大腸がん、炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎等) (13) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (14) 著しく胃酸が少ない状態が持続する人(無酸症) (15) 医療機関で次の治療を受けている人 肝臓病、胆管閉塞、胆のう炎 <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 過敏性腸症候群(IBS)の症状改善薬、制酸剤</p> <p>3. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人

		<ul style="list-style-type: none"> ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・授乳中の人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・50歳以上の人 ・貧血がある人 ・次の診断を受けた人：糖尿病、甲状腺機能障害、副甲状腺機能亢進症 ・大腸がん、炎症性腸疾患の家族がいる人 ・腹痛、便秘がひどい人 ・胸やけがある人
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。