

販売名:ハイゼリーEX

第2類医薬品

第2類医薬品

〔使用上の注意〕

相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	胸やけ、吐き気、下痢

- 2.しばらく服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕 滋養強壮、肉体疲労・栄養障害・食欲不振・病中病後・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、虚弱体質

〔用法・用量〕 成人(15才以上) 1回1瓶(100mL)を1日1回服用してください。なお、15才未満は服用しないでください。●用法・用量を守ってください。

〔成 分〕 1瓶(100mL)中 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム300mg、ローヤルゼリー200mg、人參エキス90mg(ニンジン603mgに相当)、ゴオウ抽出液200 μ L(ゴオウ2mgに相当)、イカリ草エキス20mg(イカリソウ200mgに相当)、オウセイ流エキス500 μ L(オウセイ500mgに相当)、タウリン1000mg、ビタミンB1硝酸塩10mg、ビタミンB2リン酸エステル5mg、ビタミンB610mg、ニコチン酸アミド20mg、カルニチン塩化物50mg 添加物:異性化糖、還元麦芽糖水アメ、クエン酸、クエン酸Na、カラメル、安息香酸Na、香料、トメントール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、グリセリン、pH調節剤2成分(アルコール0.3mL以下)
●本剤に配合されているビタミンB2リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。



ゼリア新薬

滋養強壮保健剤


ハイゼリー

EX

100mL

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



4 987103 033813

副作用被害救済制度
0120-149-931

金 属:キャップ
ガ ラ ス:瓶



(製造販売元) 東京都中央区日本橋小舟町10-11

ゼリア新薬工業株式会社

お客様相談室 ☎03-3661-2080

製造番号

使用期限
[年/月]

ハイゼリーはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。 J11N