

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



デリケート部分の肌トラブル(かゆみ・かぶれ)に

プレバリンマイケア


肌トラブル治療薬

デリケートな部分だから早く治したい!

お肌がやわらかいデリケートな部分は、ちょっとした刺激でもかゆみが出たり赤くなったりすることがあります。汗やむれ、肌着や衣類などのこすれ等がその原因ですが、誰もそんな症状から早く治りたいと思っています。

また、かゆみがひどく、無意識のうちに掻いてしまうとバリア機能が低下して、肌が本来もっている抵抗力が弱くなり、肌環境も悪化させてしまいます。

プレバリンマイケアは、そんなデリケートな部分の肌トラブルに、早く対処して肌を元の状態に早く戻すことを考えたクリーム剤です。



デリケートな部分(例)



お肌の早期回復を考えたクリーム剤

1) 弱酸性のクリーム剤


お肌のpHに合わせた弱酸性クリームだから、患部をやさしく治します。

2) お肌の回復を考えた5つの有効成分

リドカインやジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみを抑え、グリチルリチン酸二カリウムが炎症を抑えます。アラントインが表皮の修復を早め、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE酢酸エステル)が血行を促進して、患部の回復を早めます。

3) デリケートな部位のかゆみや炎症を抑えます

ステロイドが配合されていないので、デリケートゾーンやお顔の赤みにも使用できます。



*トコフェロール酢酸エステル由来

イメージ図

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。

(必ず裏面もお読みください)

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

かゆみ、かぶれ、ただれ、あせも、湿疹、皮膚炎、しもやけ、虫さされ、じんましん

〔用法・用量〕


1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

〔チューブの穴のあけ方〕

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててあげてください。



〔成分〕 100g中

ジフェンヒドラミン塩酸塩2g
 トコフェロール酢酸エステル0.5g
 リドカイン2g
 グリチルリチン酸二カリウム0.5g
 アラントイン0.2g
 添加物：ヒアルロン酸Na、エデト酸Na水和物、クエン酸水和物、L-乳酸、軽質流動パラフィン、白色ワセリン、キサンタンガム、セトステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ブチルパラベン、その他2成分

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
 ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
 〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
 受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <https://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

プレバリンはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11