

滋養強壯保健剤

販売名:新ローヤルゼレントSL

〔使用上の注意〕

相談すること

第2類医薬品

新ローヤルゼレントSL

ローヤルゼリー・コンドロイチン
トウジン配合



50mL

第2類医薬品



〔製造販売元〕東京都中央区日本橋小舟町10-11

ゼリア新薬工業株式会社

お客様相談室 ☎03-3661-2080

〔成分〕1瓶(50mL)中
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム300mg,ローヤルゼリー100mg,トウジン流エキス500 μ L(トウジン500mgに相当),タウリン1000mg,ビタミンB1硝酸塩10mg,ビタミンB2リン酸エステル5mg,ビタミンB65mg,ニコチン酸アミド20mg,無水カフェイン50mg
添加物:白糖,クエン酸Na,カラメル,安息香酸Na,クエン酸,香料,バニリン,pH調節剤(アルコール0.5mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB2リン酸エステルにより,尿が黄色になることがあります。


〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)本剤はまれに混濁することがありますが,薬効には変わりありません。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

金属:キャップ,ガラス:瓶



製造番号

使用期限
[年/月]

1.服用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので,直ちに服用を中止し,この製品を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胸やけ,吐き気,下痢

2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し,この製品を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

滋養強壯,虚弱体質,発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・肉体疲労・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1回1瓶(50mL)を1日1回服用してください。なお,15才未満は服用しないこと。●用法・用量を厳守すること。

ローヤルゼレントはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

J11N