



ゼリア新薬

痔の痛み・出血の緩和に ドルマイン®H軟膏

ユーカリ油・ヒドロコルチゾン酢酸エステル・リドカイン配合 外用痔疾用薬

〔特 徴〕

1. 患部の炎症をおさえるヒドロコルチゾン酢酸エステル、傷の治りをたすけ組織を修復するアラントインなど7つの成分を配合した軟膏で、痔による代表的な4つの症状、痛み・出血・はれ・かゆみにすぐれた効果を発揮します。
2. 酸化亜鉛、ユーカリ油を配合していますので、傷ついた患部を保護し、使用時に清涼感があります。
3. 肛門外側のいぼ痔の痛みや、きれ痔(さけ痔)の出血等に効果的です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

〔用法・用量〕


適量を取り、肛門部に塗布してください。
なお、1日3回まで使用できます。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 肛門部にのみ使用してください。
- (3) 定められた用法・用量を厳守してください。



〔チューブの穴のあけ方〕



キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててあけてください。

〔成分〕 100g 中

成分	分量	はたらき
リドカイン	3g	局所の痛み・かゆみをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	0.2g	血管を収縮させ、出血をおさえます。
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g	炎症をおさえ、出血・はれ・かゆみをしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	患部を殺菌し、傷口の悪化を防ぎます。
アラントイン	1g	傷の治りをたすけ、組織を修復します。
酸化亜鉛	4g	患部を収れん・保護します。
ユーカリ油	0.1g	患部に清涼感を与えます。

添加物：バルミチン酸イソプロピル、ステアリルアルコール、セタノール、流動パラフィン、白色ワセリン

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
 ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
 〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
 受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ドルマインはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。

製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
 東京都中央区日本橋小舟町10-11