

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品



のどの炎症による痛み・はれ・声がれ、口内炎などに
セピー®AZのどスプレークール

口腔咽喉薬

〔特 徴〕

1. ハーブ生薬(カミツレ)由来の消炎成分アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)を配合したスプレータイプののどの薬です。
2. 水溶性アズレンが痛んだのどの粘膜に働いて赤みやはれを抑え、元ののどの状態にもどすサポートをします。
3. シュッと噴射することで清涼感がのどに広がります。
4. のどに広く、ソフトに噴射できるスプレーノズルを採用しています。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)口中のただれがひどい人。
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 口 | 刺激感 |
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

〔用法・用量〕

1 日数回適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)塗布用のみ使用し、内服しないでください。
- (3)定められた用法・用量を守ってください。

(必ず裏面もお読みください)

- (4)息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、軽く息をはきながら、噴射してください。
- (5)薬液を誤って大量に飲みこんだ時は、直ちに医師の診療を受けてください。
- (6)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (7)最初にご使用になる時に、液が出るまで数回、空押しを行ってください。この時ティッシュ等に向けて吹き付けるようにし、液が周囲に飛び散らないように気をつけてください。

【噴射容器の使い方】



【成分】 100mL中

成分	含量
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)	20mg

添加物：セチルピリジニウム塩化物水和物、キシリトール、l-メントール、プロピレングリコール、グリセリン、pH調節剤

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)薬液がこぼれ衣服等に付着した場合は、水又は洗剤で洗ってください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
 〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
 受付時間 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

セビーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



発売元
ゼリア新薬工業株式会社
 東京都中央区日本橋小舟町10-11



製造販売元
大洋製薬株式会社
 東京都文京区本郷3-14-16