

# 販売名：セビーハーブドリンク

〔使用上の注意〕

〔してはいけないこと〕

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）  
●長期連用しないこと

〔相談すること〕

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
（1）医師の治療を受けている人。  
（2）高齢者。  
（3）むくみのある人。  
（4）心臓病、高血圧、腎臓病の診断を受けた人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：発疹  
消化器：胸やけ、吐き気、下痢  
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
腎アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・肉体疲労・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

〔用法・用量〕成人（15才以上）1回1瓶（30mL）、1日2回服用する。なお、15才未満は服用しない。

●用法・用量を厳守すること。

金属：キャップ、ガラス：瓶

# CEP/E

発熱性消耗性疾患時などの栄養補給、滋養強壮に

## セビーハーブドリンク



カンゾウ



ショウキョウ



コウジン



30mL

第2類医薬品

〔成分〕1日量（2瓶60mL）中  
カンゾウ乾燥エキス900mg（カンゾウ4500mgに相当）、コウジン乾燥エキス60mg（コウジン600mgに相当）、ショウキョウ流エキス0.5mL（ショウキョウ500mgに相当）、タウリン1000mg、ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル10mg、ビタミンB<sub>6</sub>50mg

添加物：白糖、カラメル、ブチルパラベン、ポリビドン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、クエン酸Na、香料、パニコリン、エチルパニコリン、メントール、エタノール、プロピレングリコール、pH調整剤2成分（アルコール0.3mL以下）〔保管及び取扱い上の注意〕（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管する。（2）小児の手のとどかない所に保管する。（3）本剤はまれに混濁することがあるが、薬効には変わりない。（4）使用期限を過ぎた製品は服用しない。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元  
ゼリア新薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町10-11  
お客様相談室 ☎03-3661-2080

セビーはゼリア新薬工業（株）の登録商標です。

製造番号

使用期限  
〔年、月〕

