

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



スーッと溶けてのみやすい

STOMA COOL-A 細粒

STOMA COOL-A

胃腸薬

〔特 徴〕

- ・ 3種の胃粘膜修復剤(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・アルジオキサ・L-グルタミン)が、荒れた胃を正常な状態に戻します。
- ・ 2種の制酸剤(合成ヒドロタルサイト・水酸化マグネシウム)が、過剰の胃酸を中和し、胃痛、胸やけ、むかつき等の胃の不快感を改善します。
- ・ 清涼感のある溶けやすく飲みやすい細粒剤です。



⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。

2. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 次の診断を受けた人。

腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、下痢

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

胃痛、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、飲み過ぎ(過飲)、胃部不快感、胃酸過多、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、嘔吐、げっぷ(おくび)

(必ず裏面もお読みください)

〔用法・用量〕

年齢	1回量	用法
成人(15才以上)	1包	1日3回、食前又は食間*に服用してください。
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
5才未満	服用しないでください。	



※)「食間」とは食後2～3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分〕 1日量(3包)中

制酸剤

成分	分量	はたらき
合成ヒドロタルサイト	800mg	過剰の胃酸をすばやく、かつ持続的に中和し、胃痛、胸やけ、むかつき等の胃の不快感を改善します。
水酸化マグネシウム	450mg	

胃粘膜修復剤

成分	分量	はたらき
アズレンスルホン酸 ナトリウム水和物	6mg	胃に直接作用して炎症を抑え、胃粘膜の修復を促します。
アルジオキサ	120mg	荒れた胃粘膜を修復するとともに保護します。
L-グルタミン	400mg	胃の粘膜成分の生成を促し、胃粘膜の修復を助けます。

添加物：D-ソルビトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、トメントール、軽質無水ケイ酸

本剤は、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物による淡紫青色の細粒ですが、多少の色調幅があります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記に
お願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00～17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

ストマクールはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11