



目のかゆみ・紫外線による目の炎症に ビューカリア®キュアコンタクト

第3類医薬品

Viewclear CURE CONTACT

眼科用薬

〔特徴〕

- ソフト・O₂透過性・ハード・使い捨てすべてのコンタクトレンズ（カラー・コンタクトレンズを除く）を装着したまま点眼できます。また、レンズをしていない時にもご使用頂けます。
- 抗炎症成分をW（ダブル）配合した点眼薬で、眼病予防や目のかゆみに効果を発揮します。
- 角膜保護成分（コンドロイチン硫酸エステルナトリウム）が、コンタクトレンズをしている時の目の不快な症状をしずめます。
- タウリンが新陳代謝を促して目の疲れをいやします。
- 清涼化剤は配合していませんので、ソフトな差し心地です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
 はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

〔機能・効果〕

眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のかゆみ、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）

〔用法・用量〕

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

(必ず裏面もお読みください)

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量を守ってください。
- (5) コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。

〔成 分〕

成 分	分 量	はたらき
グリチルリチン酸二カリウム	0.125%	局所の炎症をしづめ、目のかゆみを抑えます。
イプシロン-アミノカプロン酸	1.5%	抗炎症作用により、目の炎症をしづめます。
タウリン	0.1%	目に栄養を与え、新陳代謝を活発にして目の疲れをいやします。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.1%	角膜を保護して、目の不快な症状をしづめます。

添加物：ヒアルロン酸ナトリウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム、ソルビン酸カリウム、エデト酸ナトリウム水和物、ホウ酸、pH調節剤

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後はなるべく速やかに(3ヵ月を目安に)使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとて使用してください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <https://www.zeria.co.jp/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



ピューカリアはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

F21

ピューカリアキュアコンタクト